



Grupo Químico: Propamida.

Tipo de producto: Herbicida.

Ingrediente activo: Propanil.

Ingrediente activo	% en peso
PROPANIL: N-(3,4 diclorofenil) propanamida (Equivalente a 360 g. de .i.a. / Lt.)	35.0
Ingredientes inertes: Solvente, Co-solventes y Emulsionantes	65.0
Total	100.00

¿Qué es Pacora ?

es un herbicida post-emergente de rápida acción selectivo al cultivo del arroz. Cuenta con un modo de acción de contacto que bloquea el proceso fotosintético en las malezas. Ofrece un control excelente sobre zacates y un eficiente control sobre ciperáceas y hojas anchas. Ofrece excelente rotación de herbicidas específicos como pirimidinas y sulfonil ureas.

Importantes recomendaciones para la aplicación de PACORA .

- Aplicar en las primeras horas del día. (es necesario más de 5 horas de sol para que el herbicida ofrezca máximo control).
- Aplicar en malezas con crecimiento activo.
- Que los suelos cuenten con buena humedad.
- Utilizar un adherente en caso que amenace lluvia o si se utiliza riego con aspersores.
- Aplicar riego dentro de las 24 o 48 horas después de la aplicación.
- No aplique PACORA dentro de 40 días después de un tratamiento de insecticidas organofosforados o carbamatos.
- No realizar aplicaciones foliares, si no hasta 2 semanas de la utilización de PACORA.
- Mezclarlo con Sperto para un mejor control de hojas anchas.
- Utilizar la dosis recomendada.

Contraindicaciones.

- Puede mostrar quemaduras en la hoja de arroz después de la aplicación, pero la planta tiene una recuperación rápida.
- No aplicar fuera del rango de temperatura de 16 a 32°C
- No aplicar PACORA en mezcla con fosforados y carbámicos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

-Lea cuidadosamente las instrucciones. -Durante su uso y manejo, utilice el equipo de protección completo (gorra, guantes, goggles, mascarilla, camisa de manga larga y botas). -Mantenga su equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundante. -Cambie con frecuencia los filtros del respirador. -No permita que el rocío de la aplicación caiga sobre la piel. -Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina como lejía. -Después de las labores, lave perfectamente sus manos y cara con agua y jabón. -No reúse la ropa que esté contaminada, sin antes lavarla perfectamente.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

-No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto. -No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. -Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos. -Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos. -No almacene en casas habitación. -No use el producto sin el equipo de protección adecuado. -Los menores de 18 años no deben manejar este producto. -Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia. -No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel. -No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado. -No destape la boquilla con la boca.

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS
SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN.**

CULTIVO	DOSIS (L / ha)	OBSERVACIONES
ARROZ	<i>Aplique de 6 a 8 L / ha</i>	Realizar la aplicación cuando la maleza tenga de 2 a 3 hojas y el cultivo fenológicamente este al inicio del amacollamiento (1-4 plantas por mata). En el caso de una sola aplicación, se recomienda que exista una germinación uniforme del arroz y de la maleza.

INTERVALO DE SEGURIDAD: 56 días entre la última aplicación y la cosecha. TIEMPO DE REENTRADA: 12 h después de la aplicación.

MALEZA QUE CONTROLA	
NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
ZACATE ESPIGA BLANCA	<i>Leptochloa uninervia</i>
ZACATE COLA DE ZORRA	<i>Leptochloa filiformis</i>
ZACATE COLORADO	<i>Echinochloa colonum</i>
ROSA BLANCA	<i>Eclipta alba</i>
CUCHARILLA	<i>Heteranthera limosa</i>
SAUCILLO	<i>Ammannia coccinea</i>