

TEMPRANO

Grupo químico	Imidazolinona
Tipo de producto	Herbicida
Ingrediente activo	IMAZETAPIR

Ingrediente activo	% en peso
IMAZETAPIR:9.72	
Ácido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]nicotínico (Equivalente a 100 g de i.a. /L a 20°C)	9.72
Agente neutralizante, humectante y diluyente	90.28
Total:	100.00

Que es Temprano?

Herbicida sistémico selectivo, luego de aplicase es absorbido por las raíces y las hojas de las malezas, se. Posee un amplio espectro de control sobre malezas de hoja ancha y hoja angosta, de aplicación en post emergencia al cultivo. Puede ser usado en cultivos como: Alfalfa, cacahuate, frijol y soya

Como actúa Temprano?

El activo se traslada a los puntos de crecimiento, donde actúa inhibiendo la síntesis aminoácidos valina, leucina e isoelina. Las malezas detienen su desarrollo, mostrando su muerte de 3 a 4 semanas.

Método de uso

Usando el equipo de protección personal indicado en el apartado de precauciones y advertencias de uso de la etiqueta. Abra cuidadosamente el producto y antes de verter el producto en el tanque de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore la cantidad de **Temprano** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. Debe aplicarse cuando la mayoría de las malezas de hoja ancha hayan brotado y antes de estos últimos amacollen. Para mejores resultados conviene que la altura de las hierbas de hoja ancha estén en desarrollo activo, no rebase los 25 cm y que el suelo tenga humedad.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUI
RECOMENDADOS
SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Alfalfa (30)	Aceitilla <i>Bidens pilosa</i> Campanilla <i>Ipomoea purpurea</i> Diente de León <i>Taraxacum officinale</i>	0.8	Realizar una aplicación dirigida en post-emergencia a la maleza
	Cola de Ardilla / Hierba Amargosa <i>Parthenium hysterophorus</i> Zacate Sedoso o Triguillo <i>Setaria sp.</i>	1.2	

Tiempo de reentrada a campos tratados: 48 horas

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Antes de utilizar el producto lea cuidadosamente la etiqueta o consulte a un técnico en agricultura para que le asesore.